

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ISSN : 0294 - 4693

DLP 17-11-83 263622

Grandes cultures

PUBLICATION PERIODIQUE
BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, ROUTE DE LA FORET - BIARD - 86 000 POITIERS - TEL (49) 58.39.02

ABONNEMENT ANNUEL 80 F.
C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN N° 38 (19/83) du 9 NOVEMBRE 1983

.....CEREALES.....

➔ JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE :

Toutes les conditions sont requises pour assurer des risques très importants de jaunisse nanisante :

. Les pucerons ailés continuent leurs vols de dissémination. Une fois installée, la production de colonies d'aptères est très rapide.

. Les résultats de test Elisa indiquent que les pucerons qui proviennent de repousses, mais aussi du maïs et de graminées adventices (brome, folle avoine) sont porteurs de virus.

Les observations du réseau montrent des infestations très fortes de cultures en Charente et Charente-Maritime qui, dès le stade 1-2 feuilles, sont colonisées sur 30 à 60 % des pieds. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, l'infestation est actuellement moins forte.

Il convient donc d'assurer en priorité une protection à partir du stade deux feuilles. En cas d'infestation très fortes et lorsque les céréales sont peu poussantes ce traitement pourra être légèrement avancé.

Attention aux mélanges d'herbicides et d'insecticides ! Se renseigner auprès des firmes sur les risques possibles d'incompatibilité.

➔ INSECTES DES CEREALES STOCKEES

Le temps actuel est favorable à la multiplication des insectes des grains. En cas d'infestation, pratiquer une ventilation sèche et froide et traiter en surface avec un insecticide homologué (malathion, dichlorvos, chlorpyrifos-méthyl ou pirimiphos-méthyl).

P.1.31

..... **COLZA**



CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

Quelques charançons sont capturés dans les cuvettes. A cette époque, il est hautement probable que tous les individus piégés soient des charançons de bourgeon terminal. Nous demandons à toutes les personnes disposant d'un piège de nous envoyer leurs captures de charançons en précisant leur origine.

En cas de captures importantes (plus d'une trentaine d'adultes en quelques jours), il deviendrait utile d'assurer une protection environ 15 jours après les premières arrivées. A cette date, cette situation ne s'est présentée dans notre réseau qu'à La Couronne (16).



DESHERBAGE (Additif à notre bulletin N° 35 du 27.09.83)

Prendre note de cette information primordiale : le KERB 50 W est utilisable sur sol gelé !

.....**CAMPAGNOL DES CHAMPS**.....

De nouvelles prospections, effectuées en début de mois, mettent en évidence une légère reprise d'activité.

SECTEURS OBSERVES :

CHARENTE	:	Vouharte, St Amand de Boixe
CHARENTE-MARITIME	:	Aulnay, Surgères, Marans
DEUX-SEVRES	:	Beauvoir-Coivert, Usseau, Villiers-en-Plaine, St Pompain, Vanzay, Caunay, Pliboux, Limalonges.
Vienne	:	St Sauvant, Rouillé, Chaunay, St Pierre d'Exideuil, Blanzay, Brux, Champniers.

Dans l'ensemble, l'activité constatée reste faible, avec peu de dégâts. Des risques de danger existent cependant de façon localisée : en bordure du Marais Poitevin (vers Marans), au Sud d'Usseau (Villeneuve-la-Comtesse, Marsais, Deuil/Mignon), dans les marais au Sud de Rochefort (St Agnant).

Il convient donc de rester vigilant et de surveiller les refuges ainsi que les vieilles prairies enherbées. Traiter si cela s'avère nécessaire.

Imprimé à la Station le 9 Novembre 1983

Précédente Note : Bull. n° 37 du 20.10.83